

## Hygieneplan für den Schulsanitätsdienst

Die Anleitungen müssen immer genau eingehalten werden.

Desinfektionslösungen müssen in einen Eimer, der vorher nicht zum Putzen benutzt wurde.

Blutflecken vorher mit kaltem Wasser abwischen.

Kontaminiertes Einwegmaterial (Kompressen, Guedeltubus, ...) in einer Tüte im Hausmüll entsorgen (nicht bei infektiösem Material!), spitzes Material vorher in Kontamedbox entsorgen.

<b>Was</b>	<b>Wie</b>	<b>Womit</b>	<b>Lös. %</b>	<b>EWZ</b>
Absaugpumpe, -zubehör	Schlauch und Absaugbehälter entleeren, mit Desinfektionsmittel durchspülen und einlegen, danach reinigen	Biguanid Fläche	0,50%	1 h
Beatmungsbeutel	Abwischen	Biguanid Fläche Aerodosin 2000 Hospisept-Tücher	0,50% 100% 100%	
Beatmungsmaske, -Ventil	Einlegen, danach reinigen	Biguanid Fläche	0,50%	1 h
Blutdruckmanschette	Schlauch abklemmen! Einlegen, bzw. abwischen	Biguanid Fläche Aerodosin 2000 Hospisept-Tücher	0,50% 100% 100%	
Hände	einreiben	Sterilium, Hospisept Tuch	100,00%	2x 2,5 min.
Liege	Abwischen	Biguanid Fläche Aerodosin 2000 Hospisept-Tücher	0,50% 100% 100%	
Pinzetten	Einlegen, danach reinigen	Biguanid Fläche	0,50%	1 h
Rescuebag	Abwischen	Biguanid Fläche Aerodosin 2000 Hospisept-Tücher	0,50% 100% 100%	
Rettungstuch	Abwischen oder einlegen	Biguanid Fläche Aerodosin 2000 Hospisept-Tücher	0,50% 100% 100%	
Scheren	Einlegen, danach reinigen	Biguanid Fläche	0,50%	1 h
Schienen	Abwischen	Biguanid Fläche Aerodosin 2000 Hospisept-Tücher	0,50% 100% 100%	

## **Desinfektionsmittel**

<i><b>Desinfektionsmittel</b></i>	<i><b>Lös. %</b></i>	
Aerodosin 2000	100,00%	Alkohol. Desinfektionsmittel
Biguanid Fläche	0,50%	1 Tüte auf 8l in einem vorher <u>nicht</u> zum Putzen benutzten Eimer
Hospisept Tücher	100,00%	Desinfektionstücher für Flächen
Sterilium	100,00%	Alkohol. Händedesinfektionsmittel für Flächen

### **Sicherheitsregeln beim Umgang mit alkoholischen Desinfektionsmitteln zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahr (gemäß UVV)**

#### Alkoholgehalt höher als 10 Gew. %:

- nur kleine Flächen von max. 2 m<sup>2</sup> bearbeiten!
- max. 50 ml Aerodosin 2000 pro m<sup>2</sup> ausbringen!
- für ausreichende Lüftung sorgen und alle Zündquellen beseitigen!
- Rauchen und offenes Licht sind verboten!
- Heiße Flächen, auch innerhalb von Geräten (Heizlüfter) müssen abgekühlt sein!
- Zusatzheizungen müssen ausgeschaltet werden!
- Stromzufuhr (220 V) müssen unterbrochen werden!
- beim Verschütten von Flüssigkeit sofort aufnehmen und gut durchlüften!