





## Schocklage auf der Trage




## Seitenlage auf der Trage




## Überheben eines Patienten in Seitenlage auf die Trage




## Lagerung bei Arterienverschluß




## Lagerung bei Venenverschluß



## Lagerung bei Bauchverletzungen




## Lagerung bei Kopfverletzungen / Schlaganfall




## Lagerung bei bevorstehender Geburt



## Fritsch'sche Lagerung




## Lagerung bei Vena-Cava-Kompressions-Syndrom




## Lagerung bei speziellen Notfällen – traumatisch bedingt

- bei Schädel-Hirn-Verletzung  
Bewußtsein vorhanden:




bewußtlos:  
– Seitenlage

- bei Gesichtsverletzungen/  
Blutungen im Mund- und Rachenraum



- bei Rückenmarksschädigungen



- bei Bauchverletzungen



Quellenangabe

- Kersten Enke, Ulf Schmidt, Bernd Domres  
Lehrbuch für präklinische Notfallmedizin ( LPN )  
Verlagsgesellschaft Stumpf & Kossendey
- Kühn, Luxem, Runggaldier  
Rettungsdienst  
Verlag Urgan & Schwarzenberg
- Deutsches Rotes Kreuz  
Handbuch für den Sanitätsdienst